



# Præsentation af delirium- pakken LKT-Palliation



REGION  
SJÆLLAND



*- vi er til for dig*

# Generelle kommentarer til pakker

**Det overordnede formål med LKT er at opnå bedst mulig palliativ indsats. Som led i dette er der udarbejdet en række pakker, som bl.a. tilstræber at sikre, at DMCG-PAL's kliniske retningslinjer implementeres.**

## **I forhold til pakker:**

- Der skal altid indgå en klinisk udredning og vurdering af det pågældende symptom og problem.
- Nogle gange vil den kliniske udredning og vurdering føre til, at der ikke er behov for at gøre yderligere – fx hvis patientens smerter vurderes optimalt varetaget.
- Personalet vurderer med kendskab til retningslinjerne og pakkens elementer, hvad der er de bedste tilbud, og patienten behandles ud fra denne samlede vurdering
- Der stilles ingen krav om behandling for, at en pakke er givet. Kravet for gennemførelse er, at der er foretaget relevant vurdering/udredning og at der er tilbudt de interventioner, der er relevante
- Såfremt der er faglige grunde relateret til den enkelte patient til ikke at tilbyde bestemte elementer i en pakke, kræves disse elementer ikke opfyldt for at pakken betragtes som givet
- Patienter, der ikke opfylder pakkens kriterier (fx ved en score 1 eller 2 for smerter) kan naturligvis alligevel have behov for den pågældende pakke

# Baggrund for pakken

- Delirium er en hyppigt forekommende tilstand – prævalenser fra 10-80% afhængigt af patientgruppen
  - Underdiagnosticeret
  - Undersøgelser viser, at der er signifikant sammenhæng mellem udvikling af delirium, indlæggelsestid og dødelighed
  - Den delirøse tilstand er en belastning for patient og pårørende
-

# Pakkens kliniske indhold

---

## **Pakken er baseret på DMCG-PAL's fire kliniske retningslinjer om delirium:**

- Confusion Assessment Method (CAM)
- Nonfarmakologisk forebyggelse
- Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende
- Farmakologisk behandling

## • **Pakken består af følgende elementer:**

- **Farmakologisk behandling** Relevant farmakologisk behandling i henhold til DMCG-PAL retningslinjer.
  - **Non-farmakologisk forebyggelse/behandling** I henhold til DMCG-PAL retningslinjer.
  - **Information om handlemuligheder til patient og pårørende**
-

# Hvornår er pakken givet?

- Man har vurderet og tilbudt relevante farmakologiske og non-farmakologiske behandlingsmuligheder i henhold til DMCG-PALs retningslinje
  - Patienten og eventuelt de pårørende er inddraget i beslutninger om behandling
-

# Hvem gives pakken til?

Deliriumpakken gives til patienter, der efter indledende deliriumscreening vurderes som delirøse i henhold til CAM.

---

# Måltal og indikator

## Alle patienter skal CAM-screenes

### For *delirøse* patienter:

- 95% af alle relevante patienter modtager **alle** elementer i delirumpakken
-

# Indtastning i KMS

## Oplysninger til LKT Palliation

**CAM score 1** (delir: kendetegn 1 og 2 og 3 eller 4 til stede) på dagen for første kontakt

0       > 0, men ikke delir       Delir       Ikke udført

**CAM score 2** (delir: kendetegn 1 og 2 og 3 eller 4 til stede) den dag EORTC 2 er udfyldt af patient (eller – hvis det ikke er sket – på det planlagte tidspunkt)

0       > 0, men ikke delir       Delir       Ikke udført

*Udfyldes hvis CAM score 1 viser delir (kendetegn 1 og 2 og 3 eller 4 til stede) på dagen for første kontakt:*

**Er Delirpakke givet?**

Ja       Nej       Uoplyst

**Har patienten pårørende?**

Ja       Nej       Uoplyst

**Er der børn i alderen 13-17 år i familien?**

Ja       Nej       Uoplyst

- **Tidstro registrering**



# Spørgsmål til delirium pakken

---

**[Anette.Hygum@rsyd.dk](mailto:Anette.Hygum@rsyd.dk)**

**[Ragnild.Rabjerg@hospice.rsyd.dk](mailto:Ragnild.Rabjerg@hospice.rsyd.dk)**

**[Mette.Hallas@rsyd.dk](mailto:Mette.Hallas@rsyd.dk)**

---