

Et deskriptivt studie med titlen:

”Udvikling af delirøse symptomer hos palliative cancerpatienter, der opholder sig i eget hjem”.

Bodil Abild Jespersen
Det Palliative Team
Århus Universitetshospital

Hvad er delirium?

- Delirium defineres som en akut indsættende forstyrrelse af bevidsthedsniveauet med reduceret evne til at fokusere, fastholde eller skifte opmærksomhed. Dette kan ledsages af kognitive forstyrrelser som nedsat hukommelse, desorientering eller perceptionsforstyrrelser (hallucinationer/vrangforestillinger) som ikke skyldes demens.
- Delirium er hjernens reaktion på biologisk overbelastning, dvs det skyldes en somatisk tilstand.

Baggrund

- Hos patienter med fremskreden kræftsygdom optræder ofte en række belastende symptomer.
- I takt med at patienten svækkes af grundsygdommen optræder delirium med tiltagende hyppighed.
- Diagnosen beror på en klinisk vurdering.
- Delirøse palliative patienter i eget hjem er ikke beskrevet.

Formål

- 1. At beskrive de patienter i eget hjem der udvikler delirøse symptomer
- 2. At beskrive sammenhæng mellem medicinering og udvikling af delirøse symptomer.
- 3. At beskrive tid fra debut af delirøse symptomer til død, evt. overflytning til institution, samt dødssted.

Hvilke symptomer udløser registrering?

- Hallucinationer
- Tankemylder og indre uro
- Motorisk uro og rastløshed
- Forstyrret døgnrytme og søvnproblemer
- Desorientering og svigtende hukommelse

Registreringen ophører når:

- - symptomerne ophører
- - patienten indlægges på sygehus eller overflyttes til hospice eller lokalcenter (der registreres hvorvidt de delirøse symptomer var årsag til indlæggelsen/overflytningen).
- - patienten dør

Kunne vores næste projekt være et
interventionstudie?

